

2009107

 大正薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場3
Tel : 0748-88-3366

効能・効果、用法・用量追加のご案内

マクロライド系抗生物質製剤

マインベース[®] DS10%小児用

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、マクロライド系抗生物質製剤 **マインベース DS10%小児用**(有効成分:クラリスロマイシン)につきまして、2009年9月17日付にて、効能・効果、用法・用量の追加承認を取得いたしましたのでご案内申し上げます。

謹白

記

新旧対照表(部追加箇所)

(旧)	(新)
<p>【効能・効果】</p> <p>一般感染症</p> <p>< 適応菌種 ></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属、クラミジア属、マイコプラズマ属</p> <p>< 適応症 ></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、百日咳</p>	<p>【効能・効果】</p> <p>1. 一般感染症</p> <p>< 適応菌種 ></p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属、クラミジア属、マイコプラズマ属</p> <p>< 適応症 ></p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、百日咳</p> <p>2. <u>後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症</u></p> <p>< 適応菌種 ></p> <p>本剤に感性のマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)</p> <p>< 適応症 ></p> <p><u>後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症</u></p>

裏面へ

【用法・用量】

一般感染症

用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1 kg あたり 10～15mg(力値)を2～3回に分けて経口投与する。

レジオネラ肺炎に対しては、1日体重1 kg あたり 15mg(力値)を2～3回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【用法・用量】

1. 一般感染症

用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1 kg あたり 10～15mg(力値)を2～3回に分けて経口投与する。

レジオネラ肺炎に対しては、1日体重1 kg あたり 15mg(力値)を2～3回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

2. 後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症

用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1 kg あたり 15mg(力値)を2回に分けて経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。