

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

事務連絡に伴う添付文書改訂のお知らせ

β -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
スペルゾン静注用 0.5g・1g
注射用スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム

2004年12月
株式会社ケミックス

この度、平成16年12月8日付厚生労働省医薬食品局安全対策課事務連絡により、「使用上の注意」の一部を改訂致しました。

なお、流通在庫の関係から、改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでに若干の日時を要しますので、すでにお手元にある製品のご使用に際しましては、ここにご案内申し上げます。改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

改訂内容

【使用上の注意】：「副作用」の「重大な副作用」の項に中毒性表皮壊死症を追記致しました。

(下線の部分が改訂)

改訂後	改訂前
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、 <u>中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群)</u> ：皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、 <u>中毒性表皮壊死症 (Lyell 症候群)</u> があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。	皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)：皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。