

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2006年10月
大正薬品工業株式会社

アレルギー性疾患治療剤

指定医薬品

キセブレンカプセル・シロップ・ドライシロップ

フマル酸ケトチフェン製剤

この度、標記製品の「使用上の注意」を改訂致しましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

改訂の概要

自主改訂により下線部を追加しました。

参考：企業報告

改 訂 後	改 訂 前																								
<p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(2)その他の副作用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">頻度不明</td> </tr> <tr> <td>泌尿器^{注)}</td> <td style="text-align: center;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注)}</td> <td style="text-align: center;">浮腫、<u>多形紅斑</u>、<u>発疹</u>、<u>蕁麻疹</u></td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td style="text-align: center;">一過性の意識消失^{注)}、眠気、倦怠感、<u>口渇</u>、<u>めまい</u>、<u>ふらつき</u>、<u>頭痛</u>、<u>味覚異常</u>、<u>しびれ感</u></td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">変更なし</td> </tr> <tr> <td>肝臓</td> </tr> <tr> <td>その他</td> </tr> </table> <p>注)：このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>		頻度不明	泌尿器 ^{注)}	変更なし	過敏症 ^{注)}	浮腫、 <u>多形紅斑</u> 、 <u>発疹</u> 、 <u>蕁麻疹</u>	精神神経系	一過性の意識消失 ^{注)} 、眠気、倦怠感、 <u>口渇</u> 、 <u>めまい</u> 、 <u>ふらつき</u> 、 <u>頭痛</u> 、 <u>味覚異常</u> 、 <u>しびれ感</u>	消化器	変更なし	肝臓	その他	<p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(2)その他の副作用</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">頻度不明</td> </tr> <tr> <td>泌尿器^{注)}</td> <td style="text-align: center;">略</td> </tr> <tr> <td>過敏症^{注)}</td> <td style="text-align: center;">浮腫、<u>発疹</u></td> </tr> <tr> <td>精神神経系</td> <td style="text-align: center;">一過性の意識消失^{注)}、眠気、倦怠感、<u>口渇</u>、<u>めまい</u>、<u>ふらつき</u>、<u>頭痛</u>、<u>味覚異常</u></td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">略</td> </tr> <tr> <td>肝臓</td> </tr> <tr> <td>その他</td> </tr> </table> <p>注)：このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。</p>		頻度不明	泌尿器 ^{注)}	略	過敏症 ^{注)}	浮腫、 <u>発疹</u>	精神神経系	一過性の意識消失 ^{注)} 、眠気、倦怠感、 <u>口渇</u> 、 <u>めまい</u> 、 <u>ふらつき</u> 、 <u>頭痛</u> 、 <u>味覚異常</u>	消化器	略	肝臓	その他
	頻度不明																								
泌尿器 ^{注)}	変更なし																								
過敏症 ^{注)}	浮腫、 <u>多形紅斑</u> 、 <u>発疹</u> 、 <u>蕁麻疹</u>																								
精神神経系	一過性の意識消失 ^{注)} 、眠気、倦怠感、 <u>口渇</u> 、 <u>めまい</u> 、 <u>ふらつき</u> 、 <u>頭痛</u> 、 <u>味覚異常</u> 、 <u>しびれ感</u>																								
消化器	変更なし																								
肝臓																									
その他																									
	頻度不明																								
泌尿器 ^{注)}	略																								
過敏症 ^{注)}	浮腫、 <u>発疹</u>																								
精神神経系	一過性の意識消失 ^{注)} 、眠気、倦怠感、 <u>口渇</u> 、 <u>めまい</u> 、 <u>ふらつき</u> 、 <u>頭痛</u> 、 <u>味覚異常</u>																								
消化器	略																								
肝臓																									
その他																									
<p>9. 過量投与 徴候、症状：<u>傾眠</u>、<u>見当識障害</u>、<u>チアノーゼ</u>、<u>呼吸困難</u>、<u>発熱</u>、<u>錯乱</u>、<u>痙攣</u>、<u>頻脈</u>、<u>徐脈</u>、<u>低血圧</u>、<u>眼振</u>、<u>可逆性昏睡</u>等。特に小児では、<u>興奮性亢進</u>、<u>痙攣</u>。</p> <p>処置：一般的な薬物除去法(催吐、胃洗浄、活性炭投与等)により、本剤を除去する。また必要に応じて対症療法を行う。</p>	<p>9. 過量投与 徴候、症状：<u>傾眠</u>、<u>見当識障害</u>、<u>チアノーゼ</u>、<u>呼吸困難</u>、<u>発熱</u>、<u>錯乱</u>、<u>痙攣</u>、<u>頻脈</u>、<u>徐脈</u>、<u>眼振</u>等 処置：一般的な薬物除去法(催吐、胃洗浄、活性炭投与等)により、本剤を除去する。また必要に応じて対症療法を行う。</p>																								

改訂内容につきましては、日薬連発行「DSU 医薬品安全対策情報 153」に掲載されます。

裏面に改訂後の「使用上の注意」全文が記載されていますので、併せてご参照下さい。

禁忌(次の患者には投与しないこと)
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)
てんかん等の痙攣性疾患、又はこれらの既往歴のある患者 [痙攣閾値を低下させることがある。]

2. 重要な基本的注意

- (1)気管支喘息に用いる場合、本剤はすでに起こっている発作を速やかに軽減する薬剤ではないので、このことを患者に十分説明しておく必要がある。
- (2)長期ステロイド療法を受けている患者で、本剤投与によりステロイドの減量をはかる場合は十分な管理下で徐々に行うこと。
- (3)眠気を催すことがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させないよう十分注意すること。

3. 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
中枢神経抑制剤(鎮静剤、催眠剤等) 抗ヒスタミン剤 アルコール	眠気、精神運動機能低下等を起こすことがある。 アルコール性飲料の摂取を制限すること。	いずれも中枢神経抑制作用を有するため。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

- 1)痙攣、興奮があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと(乳児、幼児では特に注意すること)。
- 2)AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
泌尿器 ^{注)}	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感等の膀胱炎様症状
過敏症 ^{注)}	浮腫、多形紅斑、発疹、蕁麻疹
精神神経系	一過性の意識消失 ^{注)} 、眠気、倦怠感、口渇、めまい、ふらつき、頭痛、味覚異常、しびれ感
消化器	悪心、腹痛、下痢、嘔吐、胃部不快感、食欲不振、便秘、口内炎
肝臓	AST(GOT)・ALT(GPT)・Al-P・LDH・ γ -GTPの上昇
その他	ほてり、動悸、体重増加、鼻出血、月経異常

注)：このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5. 高齢者への投与(シロップを除く)

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2)授乳中の婦人には投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。[動物実験(ラット)で乳汁中へ移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

乳児、幼児に投与する場合には、観察を十分に行い慎重に投与すること。[痙攣、興奮等の中枢神経症状があらわれることがある。]

8. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤は、アレルギー皮内反応を抑制するため、アレルギー皮内反応検査を実施する 3~5 日前より本剤の投与を中止することが望ましい。

9. 過量投与

徴候、症状：傾眠、見当識障害、チアノーゼ、呼吸困難、発熱、錯乱、痙攣、頻脈、徐脈、低血圧、眼振、可逆性昏睡等。特に小児では、興奮性亢進、痙攣。
処置：一般的な薬物除去法(催吐、胃洗浄、活性炭投与等)により、本剤を除去する。また必要に応じて対症療法を行う。

10. 適用上の注意(シロップ・ドライシロップを除く)

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。(PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている)